

表 960 脳出血の既往 体重(kg)別（腹膜透析患者）

体重	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満	36	2	38			38
(%)	(94.7)	(5.3)	(100.0)			
20～	22	1	23			23
(%)	(95.7)	(4.3)	(100.0)			
30～	149	8	157	1	14	172
(%)	(94.9)	(5.1)	(100.0)			
40～	774	38	812	4	88	904
(%)	(95.3)	(4.7)	(100.0)			
50～	1,349	60	1,409	7	175	1,591
(%)	(95.7)	(4.3)	(100.0)			
60～	1,393	43	1,436	5	175	1,616
(%)	(97.0)	(3.0)	(100.0)			
70～	689	25	714	2	95	811
(%)	(96.5)	(3.5)	(100.0)			
80～	257	7	264	4	30	298
(%)	(97.3)	(2.7)	(100.0)			
90～	86	1	87	1	16	104
(%)	(98.9)	(1.1)	(100.0)			
100～	16	1	17		3	20
(%)	(94.1)	(5.9)	(100.0)			
110～	7	1	8		2	10
(%)	(87.5)	(12.5)	(100.0)			
120～	9		9			9
(%)	(100.0)		(100.0)			
合計	4,787	187	4,974	24	598	5,596
(%)	(96.2)	(3.8)	(100.0)			
記載なし	846	55	901	11	2,433	3,345
(%)	(93.9)	(6.1)	(100.0)			
総計	5,633	242	5,875	35	3,031	8,941
(%)	(95.9)	(4.1)	(100.0)			
平均	60.64	58.63	60.56	63.63	62.12	60.74
標準偏差	13.98	14.32	13.99	14.57	12.97	13.90

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査