

表 962 脳出血の既往 BUN(mg/dL)別 (腹膜透析患者)

BUN	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	21 (91.3)	2 (8.7)	23 (100.0)		6	29
20～ (%)	167 (95.4)	8 (4.6)	175 (100.0)		8	183
30～ (%)	557 (94.4)	33 (5.6)	590 (100.0)	5	77	672
40～ (%)	1,146 (96.1)	46 (3.9)	1,192 (100.0)	7	193	1,392
50～ (%)	1,325 (95.8)	58 (4.2)	1,383 (100.0)	8	222	1,613
60～ (%)	943 (96.3)	36 (3.7)	979 (100.0)	3	168	1,150
70～ (%)	467 (96.9)	15 (3.1)	482 (100.0)	1	66	549
80～ (%)	206 (97.6)	5 (2.4)	211 (100.0)	2	32	245
90～ (%)	77 (98.7)	1 (1.3)	78 (100.0)		11	89
100～ (%)	28 (90.3)	3 (9.7)	31 (100.0)		9	40
110～ (%)	7 (100.0)		7 (100.0)			7
120～ (%)	6 (100.0)		6 (100.0)		1	7
合計 (%)	4,950 (96.0)	207 (4.0)	5,157 (100.0)	26	793	5,976
記載なし (%)	683 (95.1)	35 (4.9)	718 (100.0)	9	2,238	2,965
総計 (%)	5,633 (95.9)	242 (4.1)	5,875 (100.0)	35	3,031	8,941
平均	54.89	52.32	54.79	52.42	55.75	54.90
標準偏差	15.96	15.64	15.95	14.44	15.00	15.82

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査