

表 963 脳出血の既往 クレアチニン濃度(mg/dL)別（腹膜透析患者）

| クレアチニン<br>濃度 | 既往なし            | 既往あり         | 合計               | 不明   | 記載なし  | 総計    |
|--------------|-----------------|--------------|------------------|------|-------|-------|
| 2未満<br>(%)   | 14<br>(93.3)    | 1<br>(6.7)   | 15<br>(100.0)    |      | 2     | 17    |
| 2～<br>(%)    | 125<br>(94.7)   | 7<br>(5.3)   | 132<br>(100.0)   |      | 22    | 154   |
| 4～<br>(%)    | 481<br>(93.2)   | 35<br>(6.8)  | 516<br>(100.0)   | 2    | 57    | 575   |
| 6～<br>(%)    | 957<br>(96.4)   | 36<br>(3.6)  | 993<br>(100.0)   | 9    | 131   | 1,133 |
| 8～<br>(%)    | 1,138<br>(96.0) | 47<br>(4.0)  | 1,185<br>(100.0) | 3    | 161   | 1,349 |
| 10～<br>(%)   | 905<br>(96.1)   | 37<br>(3.9)  | 942<br>(100.0)   | 5    | 168   | 1,115 |
| 12～<br>(%)   | 698<br>(96.7)   | 24<br>(3.3)  | 722<br>(100.0)   | 3    | 123   | 848   |
| 14～<br>(%)   | 394<br>(97.0)   | 12<br>(3.0)  | 406<br>(100.0)   | 3    | 79    | 488   |
| 16～<br>(%)   | 237<br>(96.7)   | 8<br>(3.3)   | 245<br>(100.0)   | 1    | 49    | 295   |
| 合計<br>(%)    | 4,949<br>(96.0) | 207<br>(4.0) | 5,156<br>(100.0) | 26   | 792   | 5,974 |
| 記載なし<br>(%)  | 684<br>(95.1)   | 35<br>(4.9)  | 719<br>(100.0)   | 9    | 2,239 | 2,967 |
| 総計<br>(%)    | 5,633<br>(95.9) | 242<br>(4.1) | 5,875<br>(100.0) | 35   | 3,031 | 8,941 |
| 平均           | 9.85            | 9.15         | 9.82             | 9.90 | 10.33 | 9.89  |
| 標準偏差         | 3.52            | 3.47         | 3.52             | 3.19 | 3.53  | 3.53  |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査