

表 964 脳出血の既往 アルブミン濃度(g/dL)別 (腹膜透析患者)

アルブミン 濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
1.5未満 (%)	10 (90.9)	1 (9.1)	11 (100.0)		4	15
1.5～ (%)	55 (88.7)	7 (11.3)	62 (100.0)		9	71
2.0～ (%)	251 (94.7)	14 (5.3)	265 (100.0)		33	298
2.5～ (%)	830 (93.7)	56 (6.3)	886 (100.0)	4	147	1,037
3.0～ (%)	1,785 (96.1)	72 (3.9)	1,857 (100.0)	11	290	2,158
3.5～ (%)	1,601 (97.2)	46 (2.8)	1,647 (100.0)	9	250	1,906
4.0～ (%)	366 (97.9)	8 (2.1)	374 (100.0)	1	56	431
4.5～ (%)	18 (94.7)	1 (5.3)	19 (100.0)		2	21
5.0～ (%)	2 (100.0)		2 (100.0)			2
合計 (%)	4,918 (96.0)	205 (4.0)	5,123 (100.0)	25	791	5,939
記載なし (%)	715 (95.1)	37 (4.9)	752 (100.0)	10	2,240	3,002
総計 (%)	5,633 (95.9)	242 (4.1)	5,875 (100.0)	35	3,031	8,941
平均	3.29	3.08	3.28	3.35	3.26	3.28
標準偏差	0.52	0.55	0.52	0.43	0.52	0.52

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査