

表 965 脳出血の既往 CRP濃度(mg/dL)別（腹膜透析患者）

CRP濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
0.2未満 (%)	2,562 (96.2)	100 (3.8)	2,662 (100.0)	11	394	3,067
0.2～ (%)	818 (96.6)	29 (3.4)	847 (100.0)	6	142	995
0.5～ (%)	369 (95.3)	18 (4.7)	387 (100.0)	1	61	449
1.0～ (%)	251 (95.4)	12 (4.6)	263 (100.0)	2	43	308
2.0～ (%)	169 (94.4)	10 (5.6)	179 (100.0)	1	22	202
4.0～ (%)	68 (94.4)	4 (5.6)	72 (100.0)	1	10	83
6.0～ (%)	29 (90.6)	3 (9.4)	32 (100.0)		8	40
8.0～ (%)	18 (81.8)	4 (18.2)	22 (100.0)		2	24
10.0～ (%)	30 (90.9)	3 (9.1)	33 (100.0)		1	34
15.0～ (%)	7 (100.0)		7 (100.0)			7
合計 (%)	4,321 (95.9)	183 (4.1)	4,504 (100.0)	22	683	5,209
記載なし (%)	1,312 (95.7)	59 (4.3)	1,371 (100.0)	13	2,348	3,732
総計 (%)	5,633 (95.9)	242 (4.1)	5,875 (100.0)	35	3,031	8,941
平均	0.63	1.03	0.64	0.63	0.53	0.63
標準偏差	1.76	2.23	1.78	1.23	1.19	1.71

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査