

表 966 脳出血の既往 補正カルシウム濃度(mg/dL)別（腹膜透析患者）

補正 カルシウム濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
7.0未満 (%)	22 (95.7)	1 (4.3)	23 (100.0)		6	29
7.0～ (%)	28 (87.5)	4 (12.5)	32 (100.0)		4	36
7.5～ (%)	98 (94.2)	6 (5.8)	104 (100.0)	2	21	127
8.0～ (%)	233 (96.7)	8 (3.3)	241 (100.0)		45	286
8.4～ (%)	72 (96.0)	3 (4.0)	75 (100.0)	1	10	86
8.5～ (%)	759 (97.2)	22 (2.8)	781 (100.0)	6	119	906
9.0～ (%)	1,349 (96.0)	56 (4.0)	1,405 (100.0)	6	191	1,602
9.5～ (%)	1,360 (96.4)	51 (3.6)	1,411 (100.0)	5	213	1,629
10.0～ (%)	160 (94.7)	9 (5.3)	169 (100.0)	1	21	191
10.1～ (%)	443 (94.9)	24 (5.1)	467 (100.0)	3	87	557
10.5～ (%)	234 (94.4)	14 (5.6)	248 (100.0)		48	296
11.0～ (%)	92 (94.8)	5 (5.2)	97 (100.0)	1	13	111
11.5～ (%)	25 (96.2)	1 (3.8)	26 (100.0)		3	29
12.0～ (%)	24 (100.0)		24 (100.0)		3	27
合計 (%)	4,899 (96.0)	204 (4.0)	5,103 (100.0)	25	784	5,912
記載なし (%)	734 (95.1)	38 (4.9)	772 (100.0)	10	2,247	3,029
総計 (%)	5,633 (95.9)	242 (4.1)	5,875 (100.0)	35	3,031	8,941
平均	9.40	9.44	9.41	9.26	9.41	9.41
標準偏差	0.79	0.87	0.79	0.82	0.84	0.80

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査