

表 968 脳出血の既往 PTH値(pg/mL)別（腹膜透析患者）PTH測定法:intact-PTH

PTH値	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	92 (96.8)	3 (3.2)	95 (100.0)		28	123
20～ (%)	222 (95.7)	10 (4.3)	232 (100.0)		49	281
40～ (%)	210 (95.5)	10 (4.5)	220 (100.0)	2	46	268
60～ (%)	259 (93.5)	18 (6.5)	277 (100.0)		38	315
80～ (%)	256 (96.6)	9 (3.4)	265 (100.0)	1	43	309
100～ (%)	256 (96.6)	9 (3.4)	265 (100.0)		51	316
120～ (%)	245 (94.6)	14 (5.4)	259 (100.0)		46	305
140～ (%)	238 (95.2)	12 (4.8)	250 (100.0)	1	34	285
160～ (%)	236 (96.7)	8 (3.3)	244 (100.0)	1	31	276
180～ (%)	537 (96.8)	18 (3.2)	555 (100.0)		99	654
240～ (%)	9 (100.0)		9 (100.0)		1	10
241～ (%)	356 (95.2)	18 (4.8)	374 (100.0)	1	56	431
300～ (%)	279 (96.5)	10 (3.5)	289 (100.0)		42	331
360～ (%)	158 (98.1)	3 (1.9)	161 (100.0)		39	200
420～ (%)	115 (98.3)	2 (1.7)	117 (100.0)	1	21	139
480～ (%)	33 (91.7)	3 (8.3)	36 (100.0)		7	43
500～ (%)	44 (95.7)	2 (4.3)	46 (100.0)		8	54
540～ (%)	56 (94.9)	3 (5.1)	59 (100.0)	1	13	73
600～ (%)	89 (95.7)	4 (4.3)	93 (100.0)		12	105
800～ (%)	93 (96.9)	3 (3.1)	96 (100.0)		14	110
合計 (%)	3,783 (96.0)	159 (4.0)	3,942 (100.0)	8	678	4,628
記載なし (%)	300 (97.4)	8 (2.6)	308 (100.0)	3	65	376
総計 (%)	4,083 (96.1)	167 (3.9)	4,250 (100.0)	11	743	5,004
平均	225.14	211.65	224.60	225.63	219.65	223.88
標準偏差	223.93	208.34	223.31	189.05	262.09	229.31

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査