

表 970 脳出血の既往 ヘモグロビン濃度(g/dL)別（腹膜透析患者）

ヘモグロビン 濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
5未満	6		6		1	7
(%)	(100.0)		(100.0)			
5～	8	2	10		4	14
(%)	(80.0)	(20.0)	(100.0)			
6～	21	2	23		5	28
(%)	(91.3)	(8.7)	(100.0)			
7～	97	3	100		24	124
(%)	(97.0)	(3.0)	(100.0)			
8～	270	15	285	4	55	344
(%)	(94.7)	(5.3)	(100.0)			
9～	752	35	787	8	108	903
(%)	(95.6)	(4.4)	(100.0)			
10～	1,421	49	1,470	5	231	1,706
(%)	(96.7)	(3.3)	(100.0)			
11～	1,434	56	1,490	6	213	1,709
(%)	(96.2)	(3.8)	(100.0)			
12～	654	32	686	2	108	796
(%)	(95.3)	(4.7)	(100.0)			
13～	187	11	198	1	38	237
(%)	(94.4)	(5.6)	(100.0)			
14～	70	2	72		7	79
(%)	(97.2)	(2.8)	(100.0)			
合計	4,920	207	5,127	26	794	5,947
(%)	(96.0)	(4.0)	(100.0)			
記載なし	713	35	748	9	2,237	2,994
(%)	(95.3)	(4.7)	(100.0)			
総計	5,633	242	5,875	35	3,031	8,941
(%)	(95.9)	(4.1)	(100.0)			
平均	10.82	10.80	10.82	10.32	10.76	10.81
標準偏差	1.40	1.56	1.41	1.36	1.47	1.42

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査