

表 971 脳出血の既往 総コレステロール濃度(mg/dL)別 (腹膜透析患者)

総コレステロール濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
100未満 (%)	40 (97.6)	1 (2.4)	41 (100.0)		9	50
100～ (%)	121 (92.4)	10 (7.6)	131 (100.0)		29	160
120～ (%)	371 (95.6)	17 (4.4)	388 (100.0)	3	57	448
140～ (%)	659 (95.9)	28 (4.1)	687 (100.0)	5	114	806
160～ (%)	715 (96.6)	25 (3.4)	740 (100.0)	6	119	865
180～ (%)	707 (96.3)	27 (3.7)	734 (100.0)	2	97	833
200～ (%)	466 (95.5)	22 (4.5)	488 (100.0)	3	73	564
220～ (%)	275 (96.2)	11 (3.8)	286 (100.0)	1	31	318
240～ (%)	131 (97.0)	4 (3.0)	135 (100.0)		24	159
260～ (%)	120 (96.0)	5 (4.0)	125 (100.0)		24	149
合計 (%)	3,605 (96.0)	150 (4.0)	3,755 (100.0)	20	577	4,352
記載なし (%)	2,028 (95.7)	92 (4.3)	2,120 (100.0)	15	2,454	4,589
総計 (%)	5,633 (95.9)	242 (4.1)	5,875 (100.0)	35	3,031	8,941
平均	179.49	176.07	179.36	169.80	177.10	179.01
標準偏差	40.39	40.40	40.39	27.10	41.81	40.54

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査