

表 972 脳出血の既往 HDL-C濃度(mg/dL)別（腹膜透析患者）

HDL-C濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満	5	2	7		1	8
(%)	(71.4)	(28.6)	(100.0)			
20～	235	12	247		41	288
(%)	(95.1)	(4.9)	(100.0)			
30～	762	38	800	6	127	933
(%)	(95.3)	(4.8)	(100.0)			
40～	812	34	846	4	140	990
(%)	(96.0)	(4.0)	(100.0)			
50～	690	28	718	3	118	839
(%)	(96.1)	(3.9)	(100.0)			
60～	432	11	443	2	71	516
(%)	(97.5)	(2.5)	(100.0)			
70～	216	8	224		35	259
(%)	(96.4)	(3.6)	(100.0)			
80～	113	4	117	1	23	141
(%)	(96.6)	(3.4)	(100.0)			
90～	50	1	51		10	61
(%)	(98.0)	(2.0)	(100.0)			
100～	49	3	52		5	57
(%)	(94.2)	(5.8)	(100.0)			
合計	3,364	141	3,505	16	571	4,092
(%)	(96.0)	(4.0)	(100.0)			
記載なし	2,269	101	2,370	19	2,460	4,849
(%)	(95.7)	(4.3)	(100.0)			
総計	5,633	242	5,875	35	3,031	8,941
(%)	(95.9)	(4.1)	(100.0)			
平均	50.57	48.33	50.48	47.81	50.50	50.47
標準偏差	17.64	20.61	17.77	14.78	17.51	17.72

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査