

表 973 脳出血の既往 Non-HDL-C濃度(mg/dL)別（腹膜透析患者）

Non-HDL-C濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
50未満	13	3	16		2	18
(%)	(81.3)	(18.8)	(100.0)			
50～	93	4	97		17	114
(%)	(95.9)	(4.1)	(100.0)			
70～	278	13	291	1	59	351
(%)	(95.5)	(4.5)	(100.0)			
90～	552	26	578	5	77	660
(%)	(95.5)	(4.5)	(100.0)			
110～	660	24	684	1	112	797
(%)	(96.5)	(3.5)	(100.0)			
130～	547	18	565	1	96	662
(%)	(96.8)	(3.2)	(100.0)			
150～	359	17	376	3	57	436
(%)	(95.5)	(4.5)	(100.0)			
170～	221	12	233		30	263
(%)	(94.8)	(5.2)	(100.0)			
190～	104	3	107		13	120
(%)	(97.2)	(2.8)	(100.0)			
210～	71	4	75		15	90
(%)	(94.7)	(5.3)	(100.0)			
合計	2,898	124	3,022	11	478	3,511
(%)	(95.9)	(4.1)	(100.0)			
記載なし	2,735	118	2,853	24	2,553	5,430
(%)	(95.9)	(4.1)	(100.0)			
総計	5,633	242	5,875	35	3,031	8,941
(%)	(95.9)	(4.1)	(100.0)			
平均	128.75	126.70	128.67	118.27	127.46	128.47
標準偏差	37.81	40.25	37.91	28.43	38.87	38.01

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査