

表 974 脳出血の既往 収縮期血圧(mmHg)別（腹膜透析患者）

収縮期血圧	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
60未満 (%)					1	1
60～ (%)	11 (84.6)	2 (15.4)	13 (100.0)			13
80～ (%)	97 (89.8)	11 (10.2)	108 (100.0)		16	124
100～ (%)	543 (95.6)	25 (4.4)	568 (100.0)	2	71	641
120～ (%)	1,317 (96.6)	47 (3.4)	1,364 (100.0)	11	141	1,516
140～ (%)	1,362 (96.3)	53 (3.7)	1,415 (100.0)	6	158	1,579
160～ (%)	605 (95.9)	26 (4.1)	631 (100.0)	3	87	721
180～ (%)	185 (96.9)	6 (3.1)	191 (100.0)		26	217
200～ (%)	26 (96.3)	1 (3.7)	27 (100.0)		4	31
220～ (%)	8 (100.0)		8 (100.0)		2	10
合計 (%)	4,154 (96.0)	171 (4.0)	4,325 (100.0)	22	506	4,853
記載なし (%)	1,479 (95.4)	71 (4.6)	1,550 (100.0)	13	2,525	4,088
総計 (%)	5,633 (95.9)	242 (4.1)	5,875 (100.0)	35	3,031	8,941
平均	140.93	137.18	140.78	139.59	143.02	141.01
標準偏差	22.60	25.48	22.73	17.10	24.28	22.88

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査