

表 975 脳出血の既往 拡張期血圧(mmHg)別（腹膜透析患者）

拡張期血圧	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満	1		1			1
(%)	(100.0)		(100.0)			
20～	14		14		1	15
(%)	(100.0)		(100.0)			
40～	311	20	331	1	43	375
(%)	(94.0)	(6.0)	(100.0)			
60～	1,780	77	1,857	11	197	2,065
(%)	(95.9)	(4.1)	(100.0)			
80～	1,099	42	1,141	6	149	1,296
(%)	(96.3)	(3.7)	(100.0)			
90～	619	21	640	3	71	714
(%)	(96.7)	(3.3)	(100.0)			
100～	295	8	303	1	43	347
(%)	(97.4)	(2.6)	(100.0)			
120～	14	2	16		2	18
(%)	(87.5)	(12.5)	(100.0)			
140～	1		1			1
(%)	(100.0)		(100.0)			
合計	4,134	170	4,304	22	506	4,832
(%)	(96.1)	(3.9)	(100.0)			
記載なし	1,499	72	1,571	13	2,525	4,109
(%)	(95.4)	(4.6)	(100.0)			
総計	5,633	242	5,875	35	3,031	8,941
(%)	(95.9)	(4.1)	(100.0)			
平均	78.98	77.15	78.91	78.82	79.94	79.01
標準偏差	14.40	15.29	14.44	14.56	14.34	14.43

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査