

表 976 脳出血の既往 脈拍(拍/分)別 (腹膜透析患者)

脈拍	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
40未満	3	2	5			5
(%)	(60.0)	(40.0)	(100.0)			
40～	22		22		3	25
(%)	(100.0)		(100.0)			
50～	155	8	163		24	187
(%)	(95.1)	(4.9)	(100.0)			
60～	733	20	753	4	93	850
(%)	(97.3)	(2.7)	(100.0)			
70～	1,063	42	1,105	3	163	1,271
(%)	(96.2)	(3.8)	(100.0)			
80～	861	44	905	4	115	1,024
(%)	(95.1)	(4.9)	(100.0)			
90～	410	17	427	2	52	481
(%)	(96.0)	(4.0)	(100.0)			
100～	169	7	176	3	25	204
(%)	(96.0)	(4.0)	(100.0)			
110～	44	2	46		6	52
(%)	(95.7)	(4.3)	(100.0)			
120～	16	3	19		1	20
(%)	(84.2)	(15.8)	(100.0)			
合計	3,476	145	3,621	16	482	4,119
(%)	(96.0)	(4.0)	(100.0)			
記載なし	2,157	97	2,254	19	2,549	4,822
(%)	(95.7)	(4.3)	(100.0)			
総計	5,633	242	5,875	35	3,031	8,941
(%)	(95.9)	(4.1)	(100.0)			
平均	78.04	79.59	78.10	82.13	77.88	78.09
標準偏差	13.23	14.77	13.29	14.68	13.02	13.27

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査