

表 978 脳梗塞の既往 治療方法(新分類)別(透析患者全体)

治療方法 (新分類)	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
施設血液透析	159,927	37,496	197,423	848	57,370	255,641
(%)	(81.0)	(19.0)	(100.0)			
Off-line HDF	3,955	960	4,915	16	1,384	6,315
(%)	(80.5)	(19.5)	(100.0)			
On-line HDF	23,555	4,562	28,117	73	7,900	36,090
(%)	(83.8)	(16.2)	(100.0)			
Push/Pull HDF	257	100	357	1	179	537
(%)	(72.0)	(28.0)	(100.0)			
ハイオフィルトレーション	249	52	301		40	341
(%)	(82.7)	(17.3)	(100.0)			
血液濾過	9	11	20		72	92
(%)	(45.0)	(55.0)	(100.0)			
血液吸着透析 (リクセル)	1,118	198	1,316	2	305	1,623
(%)	(85.0)	(15.0)	(100.0)			
血液吸着透析 (その他)	4	1	5		2	7
(%)	(80.0)	(20.0)	(100.0)			
在宅血液透析	343	18	361	3	157	521
(%)	(95.0)	(5.0)	(100.0)			
腹膜透析 (CAPD)	2,804	403	3,207	22	1,792	5,021
(%)	(87.4)	(12.6)	(100.0)			
腹膜透析 (APD)	1,714	249	1,963	6	870	2,839
(%)	(87.3)	(12.7)	(100.0)			
腹膜透析 (CCPD)	706	82	788	9	284	1,081
(%)	(89.6)	(10.4)	(100.0)			
合計	194,641	44,132	238,773	980	70,355	310,108
(%)	(81.5)	(18.5)	(100.0)			
記載なし						
(%)						
総計	194,641	44,132	238,773	980	70,355	310,108
(%)	(81.5)	(18.5)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
 *腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの
 (C)Japanese Society for Dialysis Therapy
 2014年調査