

表 987 脳梗塞の既往 被囊性腹膜硬化症(EPS)の既往別（腹膜透析の経験があるか現在施行している患者）

被囊性腹膜硬化症(EPS)の既往	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
なし	10,666 (%)	1,406 (11.6)	12,072 (100.0)	18	99	12,189
あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴あり)	389 (%)	88 (18.4)	477 (100.0)		48	525
あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴なし)	13 (%)	2 (13.3)	15 (100.0)		1	16
あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴あり)	55 (%)	10 (15.4)	65 (100.0)		3	68
あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴なし)	54 (%)	11 (16.9)	65 (100.0)		2	67
合計	11,177 (%)	1,517 (12.0)	12,694 (100.0)	18	153	12,865
不明	225 (%)	34 (13.1)	259 (100.0)	38	7	304
記載なし	101 (%)	225 (69.0)	326 (100.0)	1	3,634	3,961
総計	11,503 (%)	1,776 (13.4)	13,279 (100.0)	57	3,794	17,130

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査