

表 995 脳梗塞の既往 糖尿病の有無別（透析患者全体）

| 糖尿病の有無 | 既往なし | 既往あり | 合計 | 不明 | 記載なし | 総計 |
|--------------|-------------------|------------------|--------------------|-----|--------|---------|
| 糖尿病なし (%) | 109,560 (86.9) | 16,479 (13.1) | 126,039 (100.0) | 288 | 3,531 | 129,858 |
| 糖尿病あり (%) | 84,717 (77.2) | 25,039 (22.8) | 109,756 (100.0) | 470 | 29,027 | 139,253 |
| 合計 (%) | 194,277 (82.4) | 41,518 (17.6) | 235,795 (100.0) | 758 | 32,558 | 269,111 |
| 不明 (%) | 364 (12.2) | 2,614 (87.8) | 2,978 (100.0) | 222 | 37,797 | 40,997 |
| 記載なし (%) | | | | | | |
| 総計 (%) | 194,641 (81.5) | 44,132 (18.5) | 238,773 (100.0) | 980 | 70,355 | 310,108 |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*糖尿病ありとは、原疾患が糖尿病性腎症または、糖尿病の既往がありの患者。

糖尿病なしとは、原疾患が糖尿病性腎症以外で且つ糖尿病の既往がない患者。

記載なしとは、原疾患と糖尿病の既往いずれも記載のなかった患者。

不明とは、上記以外。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査