

表 996 脳梗塞の既往 透析前アルブミン濃度(g/dL)別（透析患者全体）

透析前アルブミン濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
1.5未満 (%)	128 (78.0)	36 (22.0)	164 (100.0)	1	20	185
1.5～ (%)	625 (75.6)	202 (24.4)	827 (100.0)	9	153	989
2.0～ (%)	2,448 (70.7)	1,013 (29.3)	3,461 (100.0)	30	570	4,061
2.5～ (%)	9,501 (72.9)	3,535 (27.1)	13,036 (100.0)	75	2,325	15,436
3.0～ (%)	43,089 (77.6)	12,462 (22.4)	55,551 (100.0)	227	10,330	66,108
3.5～ (%)	93,946 (83.1)	19,085 (16.9)	113,031 (100.0)	403	21,801	135,235
4.0～ (%)	36,278 (86.8)	5,499 (13.2)	41,777 (100.0)	125	8,606	50,508
4.5～ (%)	2,179 (89.5)	255 (10.5)	2,434 (100.0)	12	468	2,914
5.0～ (%)	160 (87.0)	24 (13.0)	184 (100.0)	1	18	203
合計 (%)	188,354 (81.7)	42,111 (18.3)	230,465 (100.0)	883	44,291	275,639
記載なし (%)	6,287 (75.7)	2,021 (24.3)	8,308 (100.0)	97	26,064	34,469
総計 (%)	194,641 (81.5)	44,132 (18.5)	238,773 (100.0)	980	70,355	310,108
平均	3.62	3.49	3.59	3.50	3.61	3.60
標準偏差	0.44	0.46	0.44	0.51	0.44	0.44

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査