

表 998 脳梗塞の既往 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL)別（透析患者全体）

透析前補正 カルシウム濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
7.0未満 (%)	829 (85.2)	144 (14.8)	973 (100.0)	7	162	1,142
7.0～ (%)	1,165 (85.1)	204 (14.9)	1,369 (100.0)	3	277	1,649
7.5～ (%)	4,435 (84.7)	803 (15.3)	5,238 (100.0)	18	1,143	6,399
8.0～ (%)	14,218 (83.6)	2,780 (16.4)	16,998 (100.0)	54	3,387	20,439
8.4～ (%)	4,138 (83.4)	821 (16.6)	4,959 (100.0)	17	896	5,872
8.5～ (%)	46,344 (82.5)	9,802 (17.5)	56,146 (100.0)	205	10,968	67,319
9.0～ (%)	56,110 (81.6)	12,641 (18.4)	68,751 (100.0)	307	12,946	82,004
9.5～ (%)	36,761 (81.2)	8,501 (18.8)	45,262 (100.0)	141	8,566	53,969
10.0～ (%)	4,494 (80.5)	1,089 (19.5)	5,583 (100.0)	21	994	6,598
10.1～ (%)	11,325 (79.8)	2,871 (20.2)	14,196 (100.0)	54	2,727	16,977
10.5～ (%)	5,480 (79.5)	1,411 (20.5)	6,891 (100.0)	25	1,354	8,270
11.0～ (%)	1,771 (75.7)	567 (24.3)	2,338 (100.0)	12	431	2,781
11.5～ (%)	610 (74.6)	208 (25.4)	818 (100.0)	6	149	973
12.0～ (%)	410 (71.2)	166 (28.8)	576 (100.0)	3	102	681
合計 (%)	188,090 (81.7)	42,008 (18.3)	230,098 (100.0)	873	44,102	275,073
記載なし (%)	6,551 (75.5)	2,124 (24.5)	8,675 (100.0)	107	26,253	35,035
総計 (%)	194,641 (81.5)	44,132 (18.5)	238,773 (100.0)	980	70,355	310,108
平均	9.18	9.24	9.19	9.20	9.18	9.19
標準偏差	0.74	0.76	0.74	0.77	0.74	0.74

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査