

表 999 脳梗塞の既往 透析前リン濃度(mg/dL)別 (透析患者全体)

透析前リン濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
3未満 (%)	6,505 (71.3)	2,618 (28.7)	9,123 (100.0)	44	1,719	10,886
3.0～ (%)	8,740 (77.1)	2,599 (22.9)	11,339 (100.0)	51	2,192	13,582
3.5～ (%)	15,756 (79.0)	4,187 (21.0)	19,943 (100.0)	84	3,655	23,682
4.0～ (%)	23,860 (80.6)	5,752 (19.4)	29,612 (100.0)	113	5,557	35,282
4.5～ (%)	28,738 (81.7)	6,436 (18.3)	35,174 (100.0)	125	6,760	42,059
5.0～ (%)	29,440 (82.6)	6,219 (17.4)	35,659 (100.0)	129	6,930	42,718
5.5～ (%)	25,490 (83.2)	5,143 (16.8)	30,633 (100.0)	95	5,977	36,705
6.0～ (%)	4,376 (84.0)	833 (16.0)	5,209 (100.0)	13	1,039	6,261
6.1～ (%)	14,674 (83.8)	2,837 (16.2)	17,511 (100.0)	67	3,531	21,109
6.5～ (%)	12,798 (84.2)	2,395 (15.8)	15,193 (100.0)	61	3,024	18,278
7.0～ (%)	7,920 (84.8)	1,415 (15.2)	9,335 (100.0)	32	1,910	11,277
7.5～ (%)	4,858 (85.2)	844 (14.8)	5,702 (100.0)	23	1,133	6,858
8.0～ (%)	2,896 (85.6)	489 (14.4)	3,385 (100.0)	12	656	4,053
8.5～ (%)	1,819 (85.2)	316 (14.8)	2,135 (100.0)	3	434	2,572
9.0～ (%)	2,875 (86.1)	465 (13.9)	3,340 (100.0)	21	716	4,077
合計 (%)	190,745 (81.8)	42,548 (18.2)	233,293 (100.0)	873	45,233	279,399
記載なし (%)	3,896 (71.1)	1,584 (28.9)	5,480 (100.0)	107	25,122	30,709
総計 (%)	194,641 (81.5)	44,132 (18.5)	238,773 (100.0)	980	70,355	310,108
平均	5.25	5.00	5.21	5.15	5.24	5.21
標準偏差	1.42	1.43	1.42	1.56	1.43	1.43

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査