

表 1000 脳梗塞の既往 PTH値(pg/mL)別（透析患者全体）PTH測定法:intact-PTH

PTH値	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	8,036 (79.8)	2,037 (20.2)	10,073 (100.0)	39	1,761	11,873
20～ (%)	11,415 (79.7)	2,907 (20.3)	14,322 (100.0)	52	2,572	16,946
40～ (%)	12,263 (80.6)	2,957 (19.4)	15,220 (100.0)	56	2,740	18,016
60～ (%)	13,183 (80.7)	3,160 (19.3)	16,343 (100.0)	60	2,827	19,230
80～ (%)	13,364 (80.8)	3,185 (19.2)	16,549 (100.0)	57	3,007	19,613
100～ (%)	13,108 (81.5)	2,969 (18.5)	16,077 (100.0)	58	3,023	19,158
120～ (%)	12,493 (81.6)	2,809 (18.4)	15,302 (100.0)	62	2,858	18,222
140～ (%)	11,592 (82.2)	2,507 (17.8)	14,099 (100.0)	49	2,659	16,807
160～ (%)	10,463 (82.2)	2,262 (17.8)	12,725 (100.0)	50	2,398	15,173
180～ (%)	23,878 (82.9)	4,941 (17.1)	28,819 (100.0)	102	5,592	34,513
240～ (%)	309 (82.0)	68 (18.0)	377 (100.0)		67	444
241～ (%)	13,778 (83.2)	2,786 (16.8)	16,564 (100.0)	54	3,221	19,839
300～ (%)	8,066 (83.6)	1,579 (16.4)	9,645 (100.0)	26	1,855	11,526
360～ (%)	4,712 (85.0)	832 (15.0)	5,544 (100.0)	22	1,118	6,684
420～ (%)	2,780 (85.7)	465 (14.3)	3,245 (100.0)	7	673	3,925
480～ (%)	674 (83.0)	138 (17.0)	812 (100.0)	4	148	964
500～ (%)	1,062 (83.2)	214 (16.8)	1,276 (100.0)	6	282	1,564
540～ (%)	1,196 (83.8)	232 (16.2)	1,428 (100.0)	4	282	1,714
600～ (%)	2,006 (85.6)	337 (14.4)	2,343 (100.0)	2	454	2,799
800～ (%)	1,591 (85.6)	267 (14.4)	1,858 (100.0)	2	302	2,162
合計 (%)	165,969 (81.9)	36,652 (18.1)	202,621 (100.0)	712	37,839	241,172
記載なし (%)	3,496 (79.7)	892 (20.3)	4,388 (100.0)	71	1,925	6,384
総計 (%)	169,465 (81.9)	37,544 (18.1)	207,009 (100.0)	783	39,764	247,556
平均	174.24	160.32	171.72	154.64	174.93	172.17
標準偏差	166.88	150.73	164.16	119.17	163.47	163.94

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査