

表 1003 脳梗塞の既往 総コレステロール濃度(mg/dL)別（透析患者全体）

総コレステロール濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
100未満 (%)	5,048 (77.4)	1,470 (22.6)	6,518 (100.0)	44	1,268	7,830
100～ (%)	14,744 (78.3)	4,088 (21.7)	18,832 (100.0)	82	3,808	22,722
120～ (%)	28,167 (80.2)	6,964 (19.8)	35,131 (100.0)	157	6,913	42,201
140～ (%)	32,947 (81.5)	7,477 (18.5)	40,424 (100.0)	145	8,090	48,659
160～ (%)	27,727 (82.6)	5,840 (17.4)	33,567 (100.0)	113	6,563	40,243
180～ (%)	17,799 (84.0)	3,394 (16.0)	21,193 (100.0)	49	4,283	25,525
200～ (%)	9,543 (84.3)	1,778 (15.7)	11,321 (100.0)	41	2,361	13,723
220～ (%)	4,239 (84.9)	756 (15.1)	4,995 (100.0)	13	1,063	6,071
240～ (%)	1,678 (84.4)	310 (15.6)	1,988 (100.0)	6	406	2,400
260～ (%)	1,085 (84.5)	199 (15.5)	1,284 (100.0)	9	293	1,586
合計 (%)	142,977 (81.6)	32,276 (18.4)	175,253 (100.0)	659	35,048	210,960
記載なし (%)	51,664 (81.3)	11,856 (18.7)	63,520 (100.0)	321	35,307	99,148
総計 (%)	194,641 (81.5)	44,132 (18.5)	238,773 (100.0)	980	70,355	310,108
平均	156.64	152.03	155.79	150.24	156.32	155.86
標準偏差	35.66	35.34	35.65	37.72	36.14	35.74

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査