

表 1004 脳梗塞の既往 HDL-C濃度(mg/dL)別 (透析患者全体)

HDL-C濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満	480	197	677	4	115	796
(%)	(70.9)	(29.1)	(100.0)			
20～	10,243	2,930	13,173	48	2,402	15,623
(%)	(77.8)	(22.2)	(100.0)			
30～	30,863	7,706	38,569	175	7,103	45,847
(%)	(80.0)	(20.0)	(100.0)			
40～	34,905	8,203	43,108	153	8,091	51,352
(%)	(81.0)	(19.0)	(100.0)			
50～	26,082	5,254	31,336	132	6,093	37,561
(%)	(83.2)	(16.8)	(100.0)			
60～	15,804	2,759	18,563	71	3,602	22,236
(%)	(85.1)	(14.9)	(100.0)			
70～	7,853	1,286	9,139	22	1,831	10,992
(%)	(85.9)	(14.1)	(100.0)			
80～	3,781	536	4,317	16	896	5,229
(%)	(87.6)	(12.4)	(100.0)			
90～	1,640	229	1,869	5	457	2,331
(%)	(87.7)	(12.3)	(100.0)			
100～	1,363	220	1,583	3	415	2,001
(%)	(86.1)	(13.9)	(100.0)			
合計	133,014	29,320	162,334	629	31,005	193,968
(%)	(81.9)	(18.1)	(100.0)			
記載なし	61,627	14,812	76,439	351	39,350	116,140
(%)	(80.6)	(19.4)	(100.0)			
総計	194,641	44,132	238,773	980	70,355	310,108
(%)	(81.5)	(18.5)	(100.0)			
平均	49.12	46.29	48.61	46.99	49.52	48.75
標準偏差	16.72	15.65	16.57	15.08	17.42	16.71

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査