

表 1005 脳梗塞の既往 Non-HDL-C濃度(mg/dL)別（透析患者全体）

Non-HDL-C濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
50未満 (%)	2,264 (81.0)	531 (19.0)	2,795 (100.0)	24	591	3,410
50～ (%)	10,525 (79.8)	2,658 (20.2)	13,183 (100.0)	70	2,848	16,101
70～ (%)	23,813 (80.9)	5,618 (19.1)	29,431 (100.0)	135	6,003	35,569
90～ (%)	28,609 (81.4)	6,541 (18.6)	35,150 (100.0)	152	7,076	42,378
110～ (%)	23,411 (82.1)	5,109 (17.9)	28,520 (100.0)	95	5,588	34,203
130～ (%)	14,378 (82.5)	3,057 (17.5)	17,435 (100.0)	59	3,469	20,963
150～ (%)	7,288 (83.2)	1,467 (16.8)	8,755 (100.0)	40	1,795	10,590
170～ (%)	3,317 (83.8)	640 (16.2)	3,957 (100.0)	13	752	4,722
190～ (%)	1,258 (83.0)	257 (17.0)	1,515 (100.0)	7	287	1,809
210～ (%)	733 (81.7)	164 (18.3)	897 (100.0)	6	221	1,124
合計 (%)	115,596 (81.6)	26,042 (18.4)	141,638 (100.0)	601	28,630	170,869
記載なし (%)	79,045 (81.4)	18,090 (18.6)	97,135 (100.0)	379	41,725	139,239
総計 (%)	194,641 (81.5)	44,132 (18.5)	238,773 (100.0)	980	70,355	310,108
平均	107.54	105.58	107.18	103.06	106.70	107.08
標準偏差	33.58	33.33	33.54	35.79	33.89	33.61

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査