

表 1006 脳梗塞の既往 透析前収縮期血圧(mmHg)別（透析患者全体）

透析前収縮期血圧	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
60未満 (%)	28 (84.8)	5 (15.2)	33 (100.0)		7	40
60～ (%)	303 (84.9)	54 (15.1)	357 (100.0)	2	74	433
80～ (%)	2,287 (81.4)	522 (18.6)	2,809 (100.0)	13	516	3,338
100～ (%)	11,995 (81.2)	2,777 (18.8)	14,772 (100.0)	62	2,773	17,607
120～ (%)	36,895 (82.5)	7,826 (17.5)	44,721 (100.0)	186	8,364	53,271
140～ (%)	56,023 (82.3)	12,008 (17.7)	68,031 (100.0)	261	12,530	80,822
160～ (%)	39,761 (81.5)	9,033 (18.5)	48,794 (100.0)	187	9,214	58,195
180～ (%)	15,031 (80.5)	3,647 (19.5)	18,678 (100.0)	69	3,477	22,224
200～ (%)	3,715 (79.4)	965 (20.6)	4,680 (100.0)	13	853	5,546
220～ (%)	784 (80.8)	186 (19.2)	970 (100.0)	1	189	1,160
合計 (%)	166,822 (81.8)	37,023 (18.2)	203,845 (100.0)	794	37,997	242,636
記載なし (%)	27,819 (79.6)	7,109 (20.4)	34,928 (100.0)	186	32,358	67,472
総計 (%)	194,641 (81.5)	44,132 (18.5)	238,773 (100.0)	980	70,355	310,108
平均	150.98	151.76	151.12	149.61	151.18	151.13
標準偏差	24.11	24.72	24.22	23.99	24.27	24.23

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査