

表 1024 脳梗塞の既往 体重減少量(kg)別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

体重減少量	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
0.0未満 (%)	467 (76.1)	147 (23.9)	614 (100.0)	3	138	755
0.0～ (%)	5,182 (73.4)	1,881 (26.6)	7,063 (100.0)	34	1,353	8,450
1.0～ (%)	26,378 (76.5)	8,107 (23.5)	34,485 (100.0)	137	6,403	41,025
2.0～ (%)	49,254 (80.0)	12,296 (20.0)	61,550 (100.0)	232	11,379	73,161
3.0～ (%)	26,660 (83.1)	5,428 (16.9)	32,088 (100.0)	108	5,914	38,110
4.0～ (%)	6,809 (86.6)	1,057 (13.4)	7,866 (100.0)	14	1,565	9,445
5.0～ (%)	1,441 (88.0)	196 (12.0)	1,637 (100.0)	5	316	1,958
6.0～ (%)	304 (88.4)	40 (11.6)	344 (100.0)	1	50	395
7.0～ (%)	70 (90.9)	7 (9.1)	77 (100.0)		18	95
8.0～ (%)	114 (83.8)	22 (16.2)	136 (100.0)		24	160
合計 (%)	116,679 (80.0)	29,181 (20.0)	145,860 (100.0)	534	27,160	173,554
記載なし (%)	1,536 (75.3)	505 (24.7)	2,041 (100.0)	44	2,570	4,655
総計 (%)	118,215 (79.9)	29,686 (20.1)	147,901 (100.0)	578	29,730	178,209
平均	2.53	2.32	2.49	2.32	2.49	2.49
標準偏差	1.06	1.00	1.05	0.94	1.04	1.05

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査