

表 1025 脳梗塞の既往 体重減少率(%)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

| 体重減少率        | 既往なし              | 既往あり             | 合計                 | 不明   | 記載なし   | 総計      |
|--------------|-------------------|------------------|--------------------|------|--------|---------|
| 1.0未満<br>(%) | 2,311<br>(75.1)   | 765<br>(24.9)    | 3,076<br>(100.0)   | 19   | 601    | 3,696   |
| 1.0～<br>(%)  | 4,069<br>(74.1)   | 1,421<br>(25.9)  | 5,490<br>(100.0)   | 19   | 1,100  | 6,609   |
| 2.0～<br>(%)  | 10,845<br>(76.7)  | 3,296<br>(23.3)  | 14,141<br>(100.0)  | 56   | 2,724  | 16,921  |
| 3.0～<br>(%)  | 22,992<br>(78.8)  | 6,169<br>(21.2)  | 29,161<br>(100.0)  | 121  | 5,302  | 34,584  |
| 4.0～<br>(%)  | 31,423<br>(80.5)  | 7,599<br>(19.5)  | 39,022<br>(100.0)  | 138  | 7,255  | 46,415  |
| 5.0～<br>(%)  | 24,910<br>(81.4)  | 5,698<br>(18.6)  | 30,608<br>(100.0)  | 103  | 5,578  | 36,289  |
| 6.0～<br>(%)  | 12,759<br>(82.4)  | 2,722<br>(17.6)  | 15,481<br>(100.0)  | 56   | 2,890  | 18,427  |
| 7.0～<br>(%)  | 4,930<br>(83.0)   | 1,011<br>(17.0)  | 5,941<br>(100.0)   | 19   | 1,148  | 7,108   |
| 8.0～<br>(%)  | 1,537<br>(83.3)   | 308<br>(16.7)    | 1,845<br>(100.0)   | 3    | 347    | 2,195   |
| 9.0～<br>(%)  | 831<br>(82.7)     | 174<br>(17.3)    | 1,005<br>(100.0)   |      | 200    | 1,205   |
| 合計<br>(%)    | 116,607<br>(80.0) | 29,163<br>(20.0) | 145,770<br>(100.0) | 534  | 27,145 | 173,449 |
| 記載なし<br>(%)  | 1,608<br>(75.5)   | 523<br>(24.5)    | 2,131<br>(100.0)   | 44   | 2,585  | 4,760   |
| 総計<br>(%)    | 118,215<br>(79.9) | 29,686<br>(20.1) | 147,901<br>(100.0) | 578  | 29,730 | 178,209 |
| 平均           | 4.58              | 4.37             | 4.54               | 4.34 | 4.52   | 4.53    |
| 標準偏差         | 1.64              | 1.66             | 1.65               | 1.60 | 1.67   | 1.65    |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査