

表 1028 脳梗塞の既往 透析前クレアチニン濃度(mg/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

| 透析前クレアチニン<br>濃度 | 既往なし              | 既往あり             | 合計                 | 不明   | 記載なし   | 総計      |
|-----------------|-------------------|------------------|--------------------|------|--------|---------|
| 2未満<br>(%)      | 53<br>(84.1)      | 10<br>(15.9)     | 63<br>(100.0)      |      | 13     | 76      |
| 2～<br>(%)       | 898<br>(63.5)     | 516<br>(36.5)    | 1,414<br>(100.0)   | 10   | 232    | 1,656   |
| 4～<br>(%)       | 4,448<br>(67.5)   | 2,145<br>(32.5)  | 6,593<br>(100.0)   | 27   | 1,175  | 7,795   |
| 6～<br>(%)       | 14,794<br>(72.8)  | 5,526<br>(27.2)  | 20,320<br>(100.0)  | 86   | 3,600  | 24,006  |
| 8～<br>(%)       | 30,305<br>(77.6)  | 8,742<br>(22.4)  | 39,047<br>(100.0)  | 146  | 6,922  | 46,115  |
| 10～<br>(%)      | 32,820<br>(81.5)  | 7,431<br>(18.5)  | 40,251<br>(100.0)  | 137  | 7,646  | 48,034  |
| 12～<br>(%)      | 21,309<br>(85.5)  | 3,622<br>(14.5)  | 24,931<br>(100.0)  | 79   | 4,744  | 29,754  |
| 14～<br>(%)      | 9,029<br>(89.8)   | 1,022<br>(10.2)  | 10,051<br>(100.0)  | 35   | 1,950  | 12,036  |
| 16～<br>(%)      | 3,160<br>(93.1)   | 233<br>(6.9)     | 3,393<br>(100.0)   | 11   | 696    | 4,100   |
| 合計<br>(%)       | 116,816<br>(80.0) | 29,247<br>(20.0) | 146,063<br>(100.0) | 531  | 26,978 | 173,572 |
| 記載なし<br>(%)     | 1,399<br>(76.1)   | 439<br>(23.9)    | 1,838<br>(100.0)   | 47   | 2,752  | 4,637   |
| 総計<br>(%)       | 118,215<br>(79.9) | 29,686<br>(20.1) | 147,901<br>(100.0) | 578  | 29,730 | 178,209 |
| 平均              | 10.48             | 9.46             | 10.28              | 9.96 | 10.38  | 10.29   |
| 標準偏差            | 2.78              | 2.64             | 2.78               | 2.83 | 2.81   | 2.79    |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査