

表 1030 脳梗塞の既往 equilibrated Kt/V (eKt/V) 別 (施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

equilibrated Kt/V (eKt/V)	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満 (%)	87 (73.7)	31 (26.3)	118 (100.0)		16	134
0.4～ (%)	241 (74.8)	81 (25.2)	322 (100.0)	2	42	366
0.6～ (%)	1,824 (76.1)	573 (23.9)	2,397 (100.0)	17	424	2,838
0.8～ (%)	9,933 (77.5)	2,889 (22.5)	12,822 (100.0)	37	2,181	15,040
1.0～ (%)	28,564 (79.5)	7,343 (20.5)	35,907 (100.0)	126	6,362	42,395
1.2～ (%)	35,076 (80.1)	8,710 (19.9)	43,786 (100.0)	155	7,827	51,768
1.4～ (%)	21,557 (81.1)	5,008 (18.9)	26,565 (100.0)	103	4,655	31,323
1.6～ (%)	9,053 (82.2)	1,955 (17.8)	11,008 (100.0)	40	2,149	13,197
1.8～ (%)	2,981 (82.5)	631 (17.5)	3,612 (100.0)	21	744	4,377
2.0～ (%)	1,695 (84.9)	302 (15.1)	1,997 (100.0)	10	481	2,488
合計 (%)	111,011 (80.1)	27,523 (19.9)	138,534 (100.0)	511	24,881	163,926
記載なし (%)	7,204 (76.9)	2,163 (23.1)	9,367 (100.0)	67	4,849	14,283
総計 (%)	118,215 (79.9)	29,686 (20.1)	147,901 (100.0)	578	29,730	178,209
平均	1.30	1.27	1.29	1.31	1.30	1.29
標準偏差	0.27	0.27	0.27	0.29	0.28	0.27

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査