

表 1031 脳梗塞の既往 nPCR(g/kg/day)別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

nPCR	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満	236	84	320	2	47	369
(%)	(73.8)	(26.3)	(100.0)			
0.4～	5,021	2,089	7,110	32	1,276	8,418
(%)	(70.6)	(29.4)	(100.0)			
0.6～	33,222	10,102	43,324	152	7,480	50,956
(%)	(76.7)	(23.3)	(100.0)			
0.8～	48,522	10,987	59,509	199	10,803	70,511
(%)	(81.5)	(18.5)	(100.0)			
1.0～	20,137	3,614	23,751	96	4,401	28,248
(%)	(84.8)	(15.2)	(100.0)			
1.2～	3,517	575	4,092	26	798	4,916
(%)	(85.9)	(14.1)	(100.0)			
1.4～	389	74	463	4	88	555
(%)	(84.0)	(16.0)	(100.0)			
1.6～	49	19	68		11	79
(%)	(72.1)	(27.9)	(100.0)			
1.8～	15	7	22		3	25
(%)	(68.2)	(31.8)	(100.0)			
2.0～	23	11	34		4	38
(%)	(67.6)	(32.4)	(100.0)			
合計	111,131	27,562	138,693	511	24,911	164,115
(%)	(80.1)	(19.9)	(100.0)			
記載なし	7,084	2,124	9,208	67	4,819	14,094
(%)	(76.9)	(23.1)	(100.0)			
総計	118,215	29,686	147,901	578	29,730	178,209
(%)	(79.9)	(20.1)	(100.0)			
平均	0.87	0.83	0.86	0.87	0.86	0.86
標準偏差	0.17	0.18	0.18	0.19	0.18	0.18

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査