

表 1032 脳梗塞の既往 %クレアチニン産生速度(%)別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

%クレアチニン 産生速度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
60未満 (%)	7,335 (68.8)	3,325 (31.2)	10,660 (100.0)	46	1,844	12,550
60～ (%)	5,726 (74.3)	1,980 (25.7)	7,706 (100.0)	41	1,378	9,125
70～ (%)	9,060 (75.9)	2,881 (24.1)	11,941 (100.0)	40	1,973	13,954
80～ (%)	12,977 (77.6)	3,754 (22.4)	16,731 (100.0)	53	2,899	19,683
90～ (%)	16,871 (79.9)	4,240 (20.1)	21,111 (100.0)	68	3,679	24,858
100～ (%)	18,368 (81.7)	4,103 (18.3)	22,471 (100.0)	94	4,030	26,595
110～ (%)	16,857 (83.8)	3,259 (16.2)	20,116 (100.0)	66	3,672	23,854
120～ (%)	12,374 (85.3)	2,137 (14.7)	14,511 (100.0)	51	2,776	17,338
130～ (%)	6,848 (85.7)	1,145 (14.3)	7,993 (100.0)	37	1,578	9,608
140～ (%)	4,652 (86.6)	717 (13.4)	5,369 (100.0)	15	1,065	6,449
合計 (%)	111,068 (80.1)	27,541 (19.9)	138,609 (100.0)	511	24,894	164,014
記載なし (%)	7,147 (76.9)	2,145 (23.1)	9,292 (100.0)	67	4,836	14,195
総計 (%)	118,215 (79.9)	29,686 (20.1)	147,901 (100.0)	578	29,730	178,209
平均	100.12	92.40	98.58	97.14	99.64	98.74
標準偏差	25.41	27.02	25.92	27.68	26.10	25.96

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査