

表 1034 脳梗塞の既往 透析前CRP濃度(mg/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析前CRP濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
0.2未満 (%)	74,280 (83.5)	14,693 (16.5)	88,973 (100.0)	365	16,191	105,529
0.2～ (%)	23,927 (79.4)	6,222 (20.6)	30,149 (100.0)	125	5,104	35,378
0.5～ (%)	11,874 (77.4)	3,474 (22.6)	15,348 (100.0)	66	2,733	18,147
1.0～ (%)	7,622 (75.9)	2,419 (24.1)	10,041 (100.0)	42	1,689	11,772
2.0～ (%)	4,636 (75.0)	1,548 (25.0)	6,184 (100.0)	34	1,036	7,254
4.0～ (%)	1,627 (74.6)	555 (25.4)	2,182 (100.0)	16	384	2,582
6.0～ (%)	821 (75.4)	268 (24.6)	1,089 (100.0)	9	184	1,282
8.0～ (%)	442 (75.0)	147 (25.0)	589 (100.0)	3	102	694
10.0～ (%)	523 (70.9)	215 (29.1)	738 (100.0)	6	98	842
15.0～ (%)	367 (77.3)	108 (22.7)	475 (100.0)	5	80	560
合計 (%)	126,119 (81.0)	29,649 (19.0)	155,768 (100.0)	671	27,601	184,040
記載なし (%)	28,246 (82.9)	5,843 (17.1)	34,089 (100.0)	129	10,713	44,931
総計 (%)	154,365 (81.3)	35,492 (18.7)	189,857 (100.0)	800	38,314	228,971
平均	0.61	0.82	0.65	0.96	0.61	0.64
標準偏差	1.89	2.30	1.97	2.87	1.71	1.94

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査