

表 1035 脳梗塞の既往 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析前補正 カルシウム濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
7.0未満 (%)	632 (84.8)	113 (15.2)	745 (100.0)	7	122	874
7.0～ (%)	899 (85.0)	159 (15.0)	1,058 (100.0)	3	205	1,266
7.5～ (%)	3,462 (84.3)	646 (15.7)	4,108 (100.0)	15	848	4,971
8.0～ (%)	11,383 (83.3)	2,277 (16.7)	13,660 (100.0)	45	2,585	16,290
8.4～ (%)	3,310 (83.2)	667 (16.8)	3,977 (100.0)	13	686	4,676
8.5～ (%)	37,179 (82.2)	8,064 (17.8)	45,243 (100.0)	171	8,488	53,902
9.0～ (%)	44,769 (81.1)	10,403 (18.9)	55,172 (100.0)	257	9,807	65,236
9.5～ (%)	29,022 (80.8)	6,892 (19.2)	35,914 (100.0)	117	6,373	42,404
10.0～ (%)	3,595 (80.2)	885 (19.8)	4,480 (100.0)	19	728	5,227
10.1～ (%)	8,863 (79.1)	2,345 (20.9)	11,208 (100.0)	39	2,030	13,277
10.5～ (%)	4,316 (79.3)	1,129 (20.7)	5,445 (100.0)	22	986	6,453
11.0～ (%)	1,395 (75.7)	448 (24.3)	1,843 (100.0)	9	313	2,165
11.5～ (%)	476 (73.1)	175 (26.9)	651 (100.0)	3	115	769
12.0～ (%)	318 (68.8)	144 (31.2)	462 (100.0)	3	74	539
合計 (%)	149,619 (81.3)	34,347 (18.7)	183,966 (100.0)	723	33,360	218,049
記載なし (%)	4,746 (80.6)	1,145 (19.4)	5,891 (100.0)	77	4,954	10,922
総計 (%)	154,365 (81.3)	35,492 (18.7)	189,857 (100.0)	800	38,314	228,971
平均	9.17	9.24	9.19	9.19	9.17	9.18
標準偏差	0.73	0.76	0.74	0.77	0.74	0.74

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査