

表 1036 脳梗塞の既往 透析前リン濃度(mg/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析前リン濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
3未満 (%)	5,355 (70.9)	2,195 (29.1)	7,550 (100.0)	38	1,373	8,961
3.0～ (%)	7,068 (76.7)	2,151 (23.3)	9,219 (100.0)	44	1,717	10,980
3.5～ (%)	12,661 (78.3)	3,508 (21.7)	16,169 (100.0)	66	2,783	19,018
4.0～ (%)	19,178 (80.4)	4,681 (19.6)	23,859 (100.0)	90	4,243	28,192
4.5～ (%)	22,931 (81.2)	5,314 (18.8)	28,245 (100.0)	110	5,113	33,468
5.0～ (%)	23,349 (82.1)	5,081 (17.9)	28,430 (100.0)	100	5,279	33,809
5.5～ (%)	20,218 (82.8)	4,208 (17.2)	24,426 (100.0)	82	4,504	29,012
6.0～ (%)	3,449 (83.5)	683 (16.5)	4,132 (100.0)	11	785	4,928
6.1～ (%)	11,548 (83.6)	2,271 (16.4)	13,819 (100.0)	58	2,628	16,505
6.5～ (%)	10,153 (84.1)	1,914 (15.9)	12,067 (100.0)	47	2,263	14,377
7.0～ (%)	6,238 (84.6)	1,133 (15.4)	7,371 (100.0)	26	1,463	8,860
7.5～ (%)	3,800 (84.6)	693 (15.4)	4,493 (100.0)	21	845	5,359
8.0～ (%)	2,285 (85.3)	393 (14.7)	2,678 (100.0)	8	506	3,192
8.5～ (%)	1,441 (85.4)	247 (14.6)	1,688 (100.0)	3	332	2,023
9.0～ (%)	2,246 (86.1)	362 (13.9)	2,608 (100.0)	19	529	3,156
合計 (%)	151,920 (81.3)	34,834 (18.7)	186,754 (100.0)	723	34,363	221,840
記載なし (%)	2,445 (78.8)	658 (21.2)	3,103 (100.0)	77	3,951	7,131
総計 (%)	154,365 (81.3)	35,492 (18.7)	189,857 (100.0)	800	38,314	228,971
平均	5.24	4.99	5.19	5.16	5.23	5.20
標準偏差	1.42	1.43	1.42	1.59	1.44	1.43

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査