

表 1037 脳梗塞の既往 PTH値(pg/mL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）PTH測定法:intact-PTH

PTH値	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	6,439 (79.4)	1,667 (20.6)	8,106 (100.0)	30	1,376	9,512
20～ (%)	9,277 (79.3)	2,424 (20.7)	11,701 (100.0)	43	1,985	13,729
40～ (%)	9,941 (80.4)	2,416 (19.6)	12,357 (100.0)	47	2,121	14,525
60～ (%)	10,630 (80.0)	2,651 (20.0)	13,281 (100.0)	54	2,179	15,514
80～ (%)	10,708 (80.4)	2,609 (19.6)	13,317 (100.0)	50	2,304	15,671
100～ (%)	10,483 (81.2)	2,422 (18.8)	12,905 (100.0)	49	2,317	15,271
120～ (%)	10,043 (81.1)	2,335 (18.9)	12,378 (100.0)	54	2,154	14,586
140～ (%)	9,317 (81.9)	2,065 (18.1)	11,382 (100.0)	42	2,079	13,503
160～ (%)	8,365 (81.9)	1,852 (18.1)	10,217 (100.0)	43	1,847	12,107
180～ (%)	19,031 (82.4)	4,077 (17.6)	23,108 (100.0)	90	4,230	27,428
240～ (%)	232 (81.7)	52 (18.3)	284 (100.0)		54	338
241～ (%)	10,889 (82.8)	2,256 (17.2)	13,145 (100.0)	41	2,412	15,598
300～ (%)	6,271 (82.9)	1,290 (17.1)	7,561 (100.0)	24	1,407	8,992
360～ (%)	3,657 (84.7)	662 (15.3)	4,319 (100.0)	16	789	5,124
420～ (%)	2,177 (85.4)	372 (14.6)	2,549 (100.0)	6	469	3,024
480～ (%)	510 (82.3)	110 (17.7)	620 (100.0)	4	112	736
500～ (%)	813 (82.3)	175 (17.7)	988 (100.0)	6	195	1,189
540～ (%)	917 (83.7)	179 (16.3)	1,096 (100.0)	1	213	1,310
600～ (%)	1,531 (85.6)	258 (14.4)	1,789 (100.0)	2	341	2,132
800～ (%)	1,199 (85.6)	202 (14.4)	1,401 (100.0)	1	220	1,622
合計 (%)	132,430 (81.5)	30,074 (18.5)	162,504 (100.0)	603	28,804	191,911
記載なし (%)	2,582 (78.4)	712 (21.6)	3,294 (100.0)	64	1,317	4,675
総計 (%)	135,012 (81.4)	30,786 (18.6)	165,798 (100.0)	667	30,121	196,586
平均	172.12	158.35	169.57	152.63	172.59	169.97
標準偏差	164.29	144.80	160.95	115.16	161.86	160.97

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査