

表 1040 脳梗塞の既往 総コレステロール濃度(mg/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

| 総コレステロール濃度   | 既往なし              | 既往あり             | 合計                 | 不明     | 記載なし   | 総計      |
|--------------|-------------------|------------------|--------------------|--------|--------|---------|
| 100未満<br>(%) | 4,186<br>(77.3)   | 1,232<br>(22.7)  | 5,418<br>(100.0)   | 34     | 1,002  | 6,454   |
| 100～<br>(%)  | 12,214<br>(78.0)  | 3,439<br>(22.0)  | 15,653<br>(100.0)  | 68     | 2,899  | 18,620  |
| 120～<br>(%)  | 23,020<br>(79.8)  | 5,826<br>(20.2)  | 28,846<br>(100.0)  | 131    | 5,338  | 34,315  |
| 140～<br>(%)  | 26,400<br>(81.1)  | 6,137<br>(18.9)  | 32,537<br>(100.0)  | 123    | 6,166  | 38,826  |
| 160～<br>(%)  | 21,814<br>(82.0)  | 4,775<br>(18.0)  | 26,589<br>(100.0)  | 83     | 4,911  | 31,583  |
| 180～<br>(%)  | 13,688<br>(83.5)  | 2,705<br>(16.5)  | 16,393<br>(100.0)  | 40     | 3,186  | 19,619  |
| 200～<br>(%)  | 7,068<br>(83.5)   | 1,398<br>(16.5)  | 8,466<br>(100.0)   | 27     | 1,716  | 10,209  |
| 220～<br>(%)  | 3,126<br>(84.3)   | 580<br>(15.7)    | 3,706<br>(100.0)   | 10     | 759    | 4,475   |
| 240～<br>(%)  | 1,201<br>(83.6)   | 236<br>(16.4)    | 1,437<br>(100.0)   | 6      | 290    | 1,733   |
| 260～<br>(%)  | 759<br>(83.0)     | 156<br>(17.0)    | 915<br>(100.0)     | 7      | 189    | 1,111   |
| 合計<br>(%)    | 113,476<br>(81.1) | 26,484<br>(18.9) | 139,960<br>(100.0) | 529    | 26,456 | 166,945 |
| 記載なし<br>(%)  | 40,889<br>(81.9)  | 9,008<br>(18.1)  | 49,897<br>(100.0)  | 271    | 11,858 | 62,026  |
| 総計<br>(%)    | 154,365<br>(81.3) | 35,492<br>(18.7) | 189,857<br>(100.0) | 800    | 38,314 | 228,971 |
| 平均           | 155.36            | 151.27           | 154.59             | 149.31 | 155.48 | 154.71  |
| 標準偏差         | 35.17             | 35.05            | 35.18              | 37.23  | 35.75  | 35.28   |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査