

表 1041 脳梗塞の既往 HDL-C濃度(mg/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

HDL-C濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満	413	164	577	4	90	671
(%)	(71.6)	(28.4)	(100.0)			
20～	8,519	2,436	10,955	42	1,849	12,846
(%)	(77.8)	(22.2)	(100.0)			
30～	24,909	6,429	31,338	141	5,409	36,888
(%)	(79.5)	(20.5)	(100.0)			
40～	27,873	6,676	34,549	126	6,054	40,729
(%)	(80.7)	(19.3)	(100.0)			
50～	20,259	4,240	24,499	111	4,470	29,080
(%)	(82.7)	(17.3)	(100.0)			
60～	11,952	2,164	14,116	53	2,623	16,792
(%)	(84.7)	(15.3)	(100.0)			
70～	5,883	995	6,878	15	1,308	8,201
(%)	(85.5)	(14.5)	(100.0)			
80～	2,760	430	3,190	11	633	3,834
(%)	(86.5)	(13.5)	(100.0)			
90～	1,219	169	1,388	2	343	1,733
(%)	(87.8)	(12.2)	(100.0)			
100～	963	181	1,144	1	313	1,458
(%)	(84.2)	(15.8)	(100.0)			
合計	104,750	23,884	128,634	506	23,092	152,232
(%)	(81.4)	(18.6)	(100.0)			
記載なし	49,615	11,608	61,223	294	15,222	76,739
(%)	(81.0)	(19.0)	(100.0)			
総計	154,365	35,492	189,857	800	38,314	228,971
(%)	(81.3)	(18.7)	(100.0)			
平均	48.57	45.99	48.09	46.01	49.21	48.25
標準偏差	16.51	15.59	16.37	14.12	17.47	16.54

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査