

表 1043 脳梗塞の既往 透析前収縮期血圧(mmHg)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析前収縮 期血圧	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
60未満 (%)	25 (86.2)	4 (13.8)	29 (100.0)		6	35
60～ (%)	190 (84.1)	36 (15.9)	226 (100.0)	2	43	271
80～ (%)	1,613 (80.9)	380 (19.1)	1,993 (100.0)	7	377	2,377
100～ (%)	8,934 (80.5)	2,162 (19.5)	11,096 (100.0)	52	2,007	13,155
120～ (%)	28,796 (81.9)	6,375 (18.1)	35,171 (100.0)	144	6,261	41,576
140～ (%)	44,690 (81.9)	9,878 (18.1)	54,568 (100.0)	211	9,424	64,203
160～ (%)	32,131 (81.0)	7,536 (19.0)	39,667 (100.0)	160	7,016	46,843
180～ (%)	12,258 (80.2)	3,024 (19.8)	15,282 (100.0)	59	2,661	18,002
200～ (%)	3,063 (79.5)	789 (20.5)	3,852 (100.0)	13	650	4,515
220～ (%)	613 (81.1)	143 (18.9)	756 (100.0)	1	137	894
合計 (%)	132,313 (81.4)	30,327 (18.6)	162,640 (100.0)	649	28,582	191,871
記載なし (%)	22,052 (81.0)	5,165 (19.0)	27,217 (100.0)	151	9,732	37,100
総計 (%)	154,365 (81.3)	35,492 (18.7)	189,857 (100.0)	800	38,314	228,971
平均	151.58	152.14	151.68	150.73	151.44	151.64
標準偏差	23.89	24.43	24.00	24.08	24.13	24.02

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査