

表 1049 脳梗塞の既往 原疾患別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

原疾患	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎	10,744	1,640	12,384	32	2,660	15,076
(%)	(86.8)	(13.2)	(100.0)			
慢性腎盂腎炎	311	36	347		75	422
(%)	(89.6)	(10.4)	(100.0)			
急速進行性糸球体腎炎	203	26	229		55	284
(%)	(88.6)	(11.4)	(100.0)			
妊娠腎/妊娠中毒症	248	38	286	1	72	359
(%)	(86.7)	(13.3)	(100.0)			
その他の分類不能の腎炎	145	15	160		35	195
(%)	(90.6)	(9.4)	(100.0)			
多発性嚢胞腎	1,050	158	1,208	1	255	1,464
(%)	(86.9)	(13.1)	(100.0)			
腎硬化症	1,926	495	2,421	5	460	2,886
(%)	(79.6)	(20.4)	(100.0)			
悪性高血圧	213	35	248		64	312
(%)	(85.9)	(14.1)	(100.0)			
糖尿病性腎症	8,524	2,405	10,929	33	2,211	13,173
(%)	(78.0)	(22.0)	(100.0)			
SLE腎炎	288	26	314		49	363
(%)	(91.7)	(8.3)	(100.0)			
アミロイド腎	47	3	50		9	59
(%)	(94.0)	(6.0)	(100.0)			
痛風腎	108	19	127	1	26	154
(%)	(85.0)	(15.0)	(100.0)			
先天性代謝異常による腎不全	31	3	34		10	44
(%)	(91.2)	(8.8)	(100.0)			
腎・尿路結核	16	2	18		4	22
(%)	(88.9)	(11.1)	(100.0)			
腎・尿路結石	50	9	59		10	69
(%)	(84.7)	(15.3)	(100.0)			
腎・尿路腫瘍	64	9	73		12	85
(%)	(87.7)	(12.3)	(100.0)			
閉塞性尿路障害	55	8	63		11	74
(%)	(87.3)	(12.7)	(100.0)			
骨髄腫	16		16		3	19
(%)	(100.0)		(100.0)			
腎形成不全	85	1	86		15	101
(%)	(98.8)	(1.2)	(100.0)			
不明	2,349	429	2,778	9	693	3,480
(%)	(84.6)	(15.4)	(100.0)			
再導入	312	39	351		65	416
(%)	(88.9)	(11.1)	(100.0)			
その他	617	94	711	2	176	889
(%)	(86.8)	(13.2)	(100.0)			
合計	27,402	5,490	32,892	84	6,970	39,946
(%)	(83.3)	(16.7)	(100.0)			
記載なし						
(%)						
総計	27,402	5,490	32,892	84	6,970	39,946
(%)	(83.3)	(16.7)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査