

表 1057 脳梗塞の既往 透析時間(時間/回)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

透析時間	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
3.0未満	66	17	83	1	8	92
(%)	(79.5)	(20.5)	(100.0)			
3.0～	1,433	417	1,850	4	428	2,282
(%)	(77.5)	(22.5)	(100.0)			
3.5～	1,679	391	2,070	6	403	2,479
(%)	(81.1)	(18.9)	(100.0)			
4.0～	17,966	3,734	21,700	63	4,671	26,434
(%)	(82.8)	(17.2)	(100.0)			
4.5～	2,878	417	3,295	5	548	3,848
(%)	(87.3)	(12.7)	(100.0)			
5.0～	2,913	448	3,361	4	667	4,032
(%)	(86.7)	(13.3)	(100.0)			
5.5～	170	26	196		22	218
(%)	(86.7)	(13.3)	(100.0)			
6.0～	236	18	254		30	284
(%)	(92.9)	(7.1)	(100.0)			
6.5～	11	5	16		1	17
(%)	(68.8)	(31.3)	(100.0)			
7.0～	29	2	31		5	36
(%)	(93.5)	(6.5)	(100.0)			
合計	27,381	5,475	32,856	83	6,783	39,722
(%)	(83.3)	(16.7)	(100.0)			
記載なし	21	15	36	1	187	224
(%)	(58.3)	(41.7)	(100.0)			
総計	27,402	5,490	32,892	84	6,970	39,946
(%)	(83.3)	(16.7)	(100.0)			
平均	4.12	4.03	4.10	3.98	4.08	4.10
標準偏差	0.51	0.50	0.51	0.44	0.48	0.50

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査