

表 1058 脳梗塞の既往 血流量(ml/分)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

血流量	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
100未満 (%)					1	1
100～ (%)	23 (67.6)	11 (32.4)	34 (100.0)		3	37
120～ (%)	64 (78.0)	18 (22.0)	82 (100.0)		12	94
140～ (%)	850 (76.1)	267 (23.9)	1,117 (100.0)	9	216	1,342
160～ (%)	353 (71.5)	141 (28.5)	494 (100.0)	1	83	578
180～ (%)	1,885 (80.0)	471 (20.0)	2,356 (100.0)	11	579	2,946
200～ (%)	9,141 (81.2)	2,122 (18.8)	11,263 (100.0)	29	2,255	13,547
220～ (%)	4,645 (84.3)	865 (15.7)	5,510 (100.0)	11	1,086	6,607
240～ (%)	6,558 (85.9)	1,078 (14.1)	7,636 (100.0)	6	1,485	9,127
260～ (%)	805 (88.4)	106 (11.6)	911 (100.0)	3	164	1,078
280～ (%)	743 (88.2)	99 (11.8)	842 (100.0)	1	177	1,020
300～ (%)	1,885 (88.7)	239 (11.3)	2,124 (100.0)	4	337	2,465
350～ (%)	263 (90.4)	28 (9.6)	291 (100.0)		54	345
400～ (%)	147 (91.3)	14 (8.7)	161 (100.0)		41	202
合計 (%)	27,362 (83.4)	5,459 (16.6)	32,821 (100.0)	75	6,493	39,389
記載なし (%)	40 (56.3)	31 (43.7)	71 (100.0)	9	477	557
総計 (%)	27,402 (83.3)	5,490 (16.7)	32,892 (100.0)	84	6,970	39,946
平均	226.05	216.52	224.46	207.60	222.94	224.18
標準偏差	40.73	38.00	40.44	40.50	39.85	40.35

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査