

表 1061 脳梗塞の既往 体重減少量(kg)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

体重減少量	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
0.0未満 (%)	78 (91.8)	7 (8.2)	85 (100.0)	1	11	97
0.0～ (%)	870 (77.4)	254 (22.6)	1,124 (100.0)	3	193	1,320
1.0～ (%)	4,997 (80.2)	1,237 (19.8)	6,234 (100.0)	14	1,152	7,400
2.0～ (%)	10,140 (82.8)	2,111 (17.2)	12,251 (100.0)	28	2,375	14,654
3.0～ (%)	5,698 (85.0)	1,003 (15.0)	6,701 (100.0)	6	1,307	8,014
4.0～ (%)	1,606 (87.6)	228 (12.4)	1,834 (100.0)	2	355	2,191
5.0～ (%)	291 (89.0)	36 (11.0)	327 (100.0)	1	72	400
6.0～ (%)	46 (95.8)	2 (4.2)	48 (100.0)		11	59
7.0～ (%)	11 (78.6)	3 (21.4)	14 (100.0)		2	16
8.0～ (%)	19 (65.5)	10 (34.5)	29 (100.0)		1	30
合計 (%)	23,756 (82.9)	4,891 (17.1)	28,647 (100.0)	55	5,479	34,181
記載なし (%)	122 (72.6)	46 (27.4)	168 (100.0)	11	611	790
総計 (%)	23,878 (82.9)	4,937 (17.1)	28,815 (100.0)	66	6,090	34,971
平均	2.59	2.44	2.57	2.28	2.58	2.57
標準偏差	1.02	1.12	1.04	0.91	0.99	1.03

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査