

表 1062 脳梗塞の既往 体重減少率(%)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

体重減少率	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
1.0未満 (%)	409 (80.2)	101 (19.8)	510 (100.0)	2	75	587
1.0～ (%)	718 (78.9)	192 (21.1)	910 (100.0)	2	179	1,091
2.0～ (%)	2,058 (80.3)	504 (19.7)	2,562 (100.0)	3	465	3,030
3.0～ (%)	4,724 (81.3)	1,087 (18.7)	5,811 (100.0)	10	1,072	6,893
4.0～ (%)	6,536 (83.1)	1,327 (16.9)	7,863 (100.0)	15	1,499	9,377
5.0～ (%)	5,204 (84.6)	949 (15.4)	6,153 (100.0)	17	1,254	7,424
6.0～ (%)	2,639 (85.3)	455 (14.7)	3,094 (100.0)	5	626	3,725
7.0～ (%)	999 (84.3)	186 (15.7)	1,185 (100.0)		223	1,408
8.0～ (%)	321 (84.5)	59 (15.5)	380 (100.0)	1	55	436
9.0～ (%)	137 (85.6)	23 (14.4)	160 (100.0)		30	190
合計 (%)	23,745 (82.9)	4,883 (17.1)	28,628 (100.0)	55	5,478	34,161
記載なし (%)	133 (71.1)	54 (28.9)	187 (100.0)	11	612	810
総計 (%)	23,878 (82.9)	4,937 (17.1)	28,815 (100.0)	66	6,090	34,971
平均	4.62	4.43	4.58	4.48	4.63	4.59
標準偏差	1.59	1.60	1.59	1.52	1.54	1.59

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査