

表 1063 脳梗塞の既往 Body Mass Index別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

Body Mass Index	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
14未満	97	33	130	1	18	149
(%)	(74.6)	(25.4)	(100.0)			
14～	670	201	871	3	172	1,046
(%)	(76.9)	(23.1)	(100.0)			
16～	2,827	615	3,442	10	546	3,998
(%)	(82.1)	(17.9)	(100.0)			
18～	5,426	1,110	6,536	14	1,064	7,614
(%)	(83.0)	(17.0)	(100.0)			
20～	6,045	1,173	7,218	16	1,228	8,462
(%)	(83.7)	(16.3)	(100.0)			
22～	4,705	899	5,604	8	959	6,571
(%)	(84.0)	(16.0)	(100.0)			
24～	2,909	595	3,504	6	578	4,088
(%)	(83.0)	(17.0)	(100.0)			
26～	1,592	312	1,904	2	291	2,197
(%)	(83.6)	(16.4)	(100.0)			
28～	864	148	1,012		165	1,177
(%)	(85.4)	(14.6)	(100.0)			
30～	792	104	896	1	120	1,017
(%)	(88.4)	(11.6)	(100.0)			
合計	25,927	5,190	31,117	61	5,141	36,319
(%)	(83.3)	(16.7)	(100.0)			
記載なし	1,475	300	1,775	23	1,829	3,627
(%)	(83.1)	(16.9)	(100.0)			
総計	27,402	5,490	32,892	84	6,970	39,946
(%)	(83.3)	(16.7)	(100.0)			
平均	21.74	21.40	21.68	20.49	21.61	21.67
標準偏差	3.67	3.61	3.66	3.26	3.57	3.65

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査