

表 1065 脳梗塞の既往 透析前クレアチニン濃度(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

透析前クレアチニン 濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
2未満 (%)	3 (100.0)		3 (100.0)			3
2～ (%)	84 (67.7)	40 (32.3)	124 (100.0)		23	147
4～ (%)	532 (67.9)	252 (32.1)	784 (100.0)	2	132	918
6～ (%)	2,377 (75.5)	773 (24.5)	3,150 (100.0)	10	590	3,750
8～ (%)	5,905 (79.7)	1,501 (20.3)	7,406 (100.0)	20	1,321	8,747
10～ (%)	7,159 (84.0)	1,359 (16.0)	8,518 (100.0)	16	1,613	10,147
12～ (%)	4,810 (87.2)	708 (12.8)	5,518 (100.0)	5	1,115	6,638
14～ (%)	2,102 (90.7)	216 (9.3)	2,318 (100.0)	3	499	2,820
16～ (%)	798 (94.5)	46 (5.5)	844 (100.0)		204	1,048
合計 (%)	23,770 (82.9)	4,895 (17.1)	28,665 (100.0)	56	5,497	34,218
記載なし (%)	108 (72.0)	42 (28.0)	150 (100.0)	10	593	753
総計 (%)	23,878 (82.9)	4,937 (17.1)	28,815 (100.0)	66	6,090	34,971
平均	10.87	9.86	10.69	9.70	10.86	10.72
標準偏差	2.65	2.50	2.65	2.33	2.70	2.66

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査