

表 1066 脳梗塞の既往 single pool Kt/V(Kt/Vsp)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

single pool Kt/V (Kt/Vsp)	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満 (%)	9 (56.3)	7 (43.8)	16 (100.0)		3	19
0.4～ (%)	12 (70.6)	5 (29.4)	17 (100.0)		2	19
0.6～ (%)	50 (71.4)	20 (28.6)	70 (100.0)	1	13	84
0.8～ (%)	392 (75.5)	127 (24.5)	519 (100.0)		99	618
1.0～ (%)	1,958 (80.9)	462 (19.1)	2,420 (100.0)	3	493	2,916
1.2～ (%)	5,149 (81.8)	1,143 (18.2)	6,292 (100.0)	13	1,201	7,506
1.4～ (%)	6,307 (83.1)	1,280 (16.9)	7,587 (100.0)	18	1,367	8,972
1.6～ (%)	4,770 (83.8)	920 (16.2)	5,690 (100.0)	10	973	6,673
1.8～ (%)	2,579 (86.1)	417 (13.9)	2,996 (100.0)	7	537	3,540
2.0～ (%)	1,854 (85.8)	308 (14.2)	2,162 (100.0)	3	403	2,568
合計 (%)	23,080 (83.1)	4,689 (16.9)	27,769 (100.0)	55	5,091	32,915
記載なし (%)	798 (76.3)	248 (23.7)	1,046 (100.0)	11	999	2,056
総計 (%)	23,878 (82.9)	4,937 (17.1)	28,815 (100.0)	66	6,090	34,971
平均	1.55	1.51	1.54	1.54	1.53	1.54
標準偏差	0.31	0.31	0.31	0.29	0.31	0.31

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査