

表 1067 脳梗塞の既往 equilibrated Kt/V (eKt/V) 別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

equilibrated Kt/V (eKt/V)	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満 (%)	9 (56.3)	7 (43.8)	16 (100.0)		4	20
0.4～ (%)	24 (66.7)	12 (33.3)	36 (100.0)	1	7	44
0.6～ (%)	204 (72.3)	78 (27.7)	282 (100.0)		54	336
0.8～ (%)	1,450 (79.0)	386 (21.0)	1,836 (100.0)	2	373	2,211
1.0～ (%)	5,136 (81.6)	1,156 (18.4)	6,292 (100.0)	13	1,197	7,502
1.2～ (%)	7,135 (83.3)	1,431 (16.7)	8,566 (100.0)	18	1,555	10,139
1.4～ (%)	5,074 (83.9)	976 (16.1)	6,050 (100.0)	15	1,065	7,130
1.6～ (%)	2,483 (86.6)	384 (13.4)	2,867 (100.0)	4	501	3,372
1.8～ (%)	934 (85.1)	164 (14.9)	1,098 (100.0)	1	193	1,292
2.0～ (%)	647 (87.0)	97 (13.0)	744 (100.0)	1	145	890
合計 (%)	23,096 (83.1)	4,691 (16.9)	27,787 (100.0)	55	5,094	32,936
記載なし (%)	782 (76.1)	246 (23.9)	1,028 (100.0)	11	996	2,035
総計 (%)	23,878 (82.9)	4,937 (17.1)	28,815 (100.0)	66	6,090	34,971
平均	1.36	1.31	1.35	1.34	1.34	1.35
標準偏差	0.29	0.28	0.29	0.26	0.29	0.29

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査