

表 1068 脳梗塞の既往 nPCR(g/kg/day)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

nPCR	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満	27	11	38		5	43
(%)	(71.1)	(28.9)	(100.0)			
0.4～	694	266	960	1	169	1,130
(%)	(72.3)	(27.7)	(100.0)			
0.6～	6,160	1,537	7,697	24	1,352	9,073
(%)	(80.0)	(20.0)	(100.0)			
0.8～	10,540	2,014	12,554	19	2,307	14,880
(%)	(84.0)	(16.0)	(100.0)			
1.0～	4,726	746	5,472	9	1,050	6,531
(%)	(86.4)	(13.6)	(100.0)			
1.2～	871	98	969	2	196	1,167
(%)	(89.9)	(10.1)	(100.0)			
1.4～	96	17	113		15	128
(%)	(85.0)	(15.0)	(100.0)			
1.6～	6	5	11		2	13
(%)	(54.5)	(45.5)	(100.0)			
1.8～	1		1			1
(%)	(100.0)		(100.0)			
2.0～	3	3	6			6
(%)	(50.0)	(50.0)	(100.0)			
合計	23,124	4,697	27,821	55	5,096	32,972
(%)	(83.1)	(16.9)	(100.0)			
記載なし	754	240	994	11	994	1,999
(%)	(75.9)	(24.1)	(100.0)			
総計	23,878	4,937	28,815	66	6,090	34,971
(%)	(82.9)	(17.1)	(100.0)			
平均	0.89	0.85	0.88	0.86	0.89	0.88
標準偏差	0.17	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査