

表 1069 脳梗塞の既往 %クレアチニン産生速度(%)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

%クレアチニン 産生速度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
60未満 (%)	995 (71.1)	405 (28.9)	1,400 (100.0)	4	230	1,634
60～ (%)	911 (76.6)	279 (23.4)	1,190 (100.0)	2	212	1,404
70～ (%)	1,663 (78.4)	459 (21.6)	2,122 (100.0)	4	352	2,478
80～ (%)	2,686 (80.9)	633 (19.1)	3,319 (100.0)	8	541	3,868
90～ (%)	3,520 (81.9)	777 (18.1)	4,297 (100.0)	13	790	5,100
100～ (%)	4,190 (84.9)	743 (15.1)	4,933 (100.0)	12	889	5,834
110～ (%)	3,939 (86.1)	634 (13.9)	4,573 (100.0)	7	819	5,399
120～ (%)	2,793 (87.2)	410 (12.8)	3,203 (100.0)	2	638	3,843
130～ (%)	1,485 (87.2)	218 (12.8)	1,703 (100.0)	3	386	2,092
140～ (%)	933 (87.3)	136 (12.7)	1,069 (100.0)		239	1,308
合計 (%)	23,115 (83.1)	4,694 (16.9)	27,809 (100.0)	55	5,096	32,960
記載なし (%)	763 (75.8)	243 (24.2)	1,006 (100.0)	11	994	2,011
総計 (%)	23,878 (82.9)	4,937 (17.1)	28,815 (100.0)	66	6,090	34,971
平均	102.78	96.08	101.65	95.38	103.49	101.92
標準偏差	23.22	25.61	23.77	22.20	24.40	23.87

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査