

表 1070 脳梗塞の既往 透析前アルブミン濃度(g/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前アルブミン濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
1.5未満 (%)	9 (90.0)	1 (10.0)	10 (100.0)			10
1.5～ (%)	43 (78.2)	12 (21.8)	55 (100.0)		7	62
2.0～ (%)	168 (67.5)	81 (32.5)	249 (100.0)	3	42	294
2.5～ (%)	841 (71.4)	337 (28.6)	1,178 (100.0)	6	208	1,392
3.0～ (%)	5,933 (79.8)	1,501 (20.2)	7,434 (100.0)	15	1,358	8,807
3.5～ (%)	14,590 (84.2)	2,737 (15.8)	17,327 (100.0)	33	3,225	20,585
4.0～ (%)	5,241 (87.9)	722 (12.1)	5,963 (100.0)	16	1,179	7,158
4.5～ (%)	247 (91.8)	22 (8.2)	269 (100.0)		48	317
5.0～ (%)	16 (100.0)		16 (100.0)		2	18
合計 (%)	27,088 (83.3)	5,413 (16.7)	32,501 (100.0)	73	6,069	38,643
記載なし (%)	314 (80.3)	77 (19.7)	391 (100.0)	11	901	1,303
総計 (%)	27,402 (83.3)	5,490 (16.7)	32,892 (100.0)	84	6,970	39,946
平均	3.65	3.54	3.63	3.56	3.65	3.64
標準偏差	0.38	0.41	0.39	0.48	0.38	0.39

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査